

Bacteriële Vaginose

SOAIDS

Soa Aids Nederland spant zich in dat de informatie in haar voorlichtingsmateriaal zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk is. Toch aanvaardt Soa Aids Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze folder. **De informatie in onze folders kan nooit worden beschouwd als vervanging van een consult of persoonlijk bezoek aan een arts of specialist.**

Dit is een publicatie van Soa Aids Nederland en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van GlaxoSmithKline. Deze folder is onderdeel van de brochure 'Soa, voorkomen-testen-behandelen'. Lees zowel de folder als de brochure zorgvuldig door als je goed op de hoogte wilt zijn. Voor meer informatie over soa en veilig vrijen kun je 24 uur per dag terecht bij de Aids Soa Infolijn (tel. 0900-2042040 of infolijn@soaids.nl).

Je kunt ook onze website bezoeken: www.SoaAids.nl



GlaxoSmithKline

www.SoaAids.nl

SOAIDS

Bacteriële Vaginose

Bacteriële vaginose is geen soa (seksueel overdraagbare aandoening), maar berust op een verstoring van het bacteriële evenwicht in de vagina. Onder gewone omstandigheden is de zuurgraad in de vagina in balans. De meeste ziektekiemen kunnen in dat evenwicht niet leven. Bepaalde situaties kunnen het evenwicht verstoren. Bijvoorbeeld het wassen van de vagina met zeep of het te lang inhouden van een tampon. Door de verstoring van het evenwicht ontstaat een minder zuur milieu, waarin bepaalde bacteriën de kans krijgen om overmatig te groeien.

Verschuiven bij de vrouw

Bacteriële vaginose geeft grijswitte afscheiding uit de vagina. De afscheiding ruikt zurig en kan zelfs een vislucht hebben. De hoeveelheid afscheiding is wisselend, soms veel, bij periodes ook weinig. Als de afscheiding met sperma in aanraking komt, wordt de geur nog sterker. Soms heb je last van jeuk en vaginale 'windjes'. Het kan voorkomen dat de klachten plotseling optreden. Je kunt bacteriële vaginose hebben zonder dat je er last van hebt.

Verschuiven bij de man

Als man kun je geïnfecteerd raken met bepaalde bacteriën, die bij vrouwen met bacteriële vaginose overmatig zijn gaan groeien. Meestal geeft dat echter geen klachten.

Onderzoek

Het vaststellen van bacteriële vaginose gebeurt door de zuurgraad van de vaginale afscheiding te bepalen, een geurtest te doen en de afscheiding onder de microscoop te bekijken.

Behandeling

Alleen als bacteriële vaginose klachten geeft, is behandeling noodzakelijk. De aandoening is goed te behandelen met een korte medicijnkuur. Van de medicijnen kun je misserig worden. Alleen als de klachten blijven terugkomen, wordt de partner meebehandeld. Tijdens de kuur mag je geen alcohol drinken. Vrouwen kunnen deze aandoening aan elkaar doorgeven. Daarom moet(en) de vrouwelijke partner(s) zich ook laten onderzoeken. Tijdens de behandeling is het beter om geen seks te hebben. Zo geef je het lichaam de gelegenheid om te herstellen.

