

TEST MIGRANTEN PROACTIEF OP HIV EN SOA'S




Migranten uit soa-endemische gebieden lopen **meer kans op soa's**. Het soa-vindpercentage is bij hen hoger dan bij autochtone Nederlanders.

Migranten met hiv zijn ook vaker **niet op de hoogte van hun hiv-status**. Ze komen daardoor te laat in zorg. Laat behandelen is ongunstig voor hun gezondheid. Vroeg opsporen en behandelen van hiv voorkomt bovendien verdere overdracht.

Gepaste aandacht voor hiv en soa's in de huisartspraktijk en een **actief testbeleid** dragen bij aan de individuele gezondheid van patiënten en verkleinen het risico op transmissie.

SOA-VINDPERCENTAGE HOGER BIJ MIGRANTEN (bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD)¹



chlamydia vindpercentage vrouwen en heteroseksuele mannen



14,9% Autochtone Nederlanders
18,5% Sub-Saharische Afrikanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen

gonorroe vindpercentage vrouwen en heteroseksuele mannen



1,1% Autochtone Nederlanders
4,6% Sub-Saharische Afrikanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen
3,1% Oost-Europeaanen

syfilis vindpercentage MSM



2,4% Autochtone Nederlanders
3,6% Sub-Saharische Afrikanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen
3,1% Oost-Europeaanen en Latijns Amerikanen

SOAIDS


EEN LATE HIV-DIAGNOSE VERLAAGT DE KWALITEIT VAN LEVEN

Onbekende hiv-infecties in Nederland:²

12%

Dit percentage is aanzienlijk hoger onder mensen afkomstig uit Sub-Saharisch Afrika en het Caribisch gebied.

Vrouwen en heteroseksuele mannen met hiv te laat in zorg (CD4<350 of met symptomen van aids) naar etniciteit.²



MIS GEEN KANSEN OP TIJDIGE HIV DIAGNOSE

70% van de soa-gerelateerde consulten vindt plaats bij de huisarts.³ Migranten gaan voor een soa-consult vaker naar de huisarts dan autochtone Nederlanders.⁴



Zestig procent van mensen met hiv bezocht in de vijf jaar voorafgaand aan diagnose de huisarts met klachten wijzend op een (acute) hiv-infectie.⁵

Bij ongeveer een derde van mensen met hiv is in het jaar voorafgaand aan diagnose één of meerdere keren bloed geprikt.⁵



U vindt de richtlijnen en praktische handvatten voor proactief testen van migranten in de huisartspraktijk op onze website: www.soaids.nl/testmigranten

¹ RIVM. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2015. Bilthoven, RIVM, 2016.

² Stichting Hiv Monitoring. Monitoring report 2015: Human Immunodeficiency Virus (HIV) in the Netherlands. Amsterdam, Stichting Hiv Monitoring, 2015, Report No. 34160453.

³ van den Broek IV, Verheij RA, van Dijk CE, Koedijk FD, van der Sande MA, van Bergen JE. Trends in sexually transmitted infections in the Netherlands, combining surveillance data from general practices and sexually transmitted infection centers. BMC family practice, 2010 May 20;11:39.

⁴ Woestenbergh PJ, van Oeffelen AA, Stirbu-Wagner I, van Benthem BH, van Bergen JE, van den Broek IV. Comparison of STI-related consultations among ethnic groups in the Netherlands: an epidemiologic study using electronic records from general practices. 2015 Jun 18;16:70.

⁵ Joore IK, Arts DL, Kruijer MJP, et al. HIV indicator condition-guided testing to reduce the number of undiagnosed patients and prevent late presentation in a high-prevalence area: a case-control study in primary care. Sex Transm Infect Published Online First: 6 July 2015 doi:10.1136/sextrans-2015-052073.